

W poniższej tabeli wymieniono produkty SELEKT, które są najbardziej odpowiednie do stosowania w różnych powszechnie występujących schorzeniach, w których zaleca się doustną płynoterapię. Formuły SELEKT są przeznaczone do podawania bezpośrednio do żwacza za pomocą pompki SELEKT.

1. W przypadkach lekkiego odwodnienia należy rozpuścić jedną saszetkę najbardziej odpowiedniej formuły SELEKT w 20 litrach ciepłej wody. W przypadkach umiarkowanego lub ciężkiego odwodnienia zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów. Po upływie trzech dni od wycielenia można podać dodatkową saszetkę preparatu SELEKT Restore rozpuszczoną w kolejnych 20 litrach ciepłej wody. W przypadku krów w pierwszych trzech dniach po wycieleniu jedną saszetkę preparatu SELEKT Fresh Cow 500 można rozpuścić w 40 litrach ciepłej wody. Nigdy nie łączyć dwóch saszetek produktu SELEKT Fresh Cow 500 lub SELEKT Off Feed i nie stosować tych dwóch produktów jednocześnie.
2. W przypadkach ostrej kwasicy żwacza należy rozpuścić jedną saszetkę preparatu SELEKT Antacid w 20 litrach ciepłej wody w przypadku bydła dorosłego oraz proporcjonalnie mniej w przypadku zwierząt niedojrzałych.
3. SELEKT Glycerol Plus należy podawać z co najmniej taką samą objętością ciepłej wody. Preparat nie zawiera żadnych substancji rozpuszczonych, dlatego w przypadku stosowania z roztworem innej formuły SELEKT nie ma potrzeby dodawania wody.

	SELEKT Antacid	SELEKT Charbon Fluide™ Activated Charcoal Liquid	SELEKT Fresh Cow 500	SELEKT Glycerol Plus	SELEKT Off Feed	SELEKT Restore
Ostra kwasica żwacza lub podostra kwasica żwacza	✓	± ✓				
Dla krów świeżo wycielonych lub po cesarskim cięciu			✓	± ✓	✗	✗
Biegunka wywołana przez mykotoksyny lub zakażenie bakteryjne		✓				✓
Odwodnienie lub wstrząs endotoksemiczny spowodowane zapaleniem gruczołu mlekowego, macicy lub pourazowym zapaleniem czepca itp.						✓
Brak apetytu na początku laktacji					✓	± ✓
Zmniejszenie ryzyka ketozy			✓	✓		
Rekonwalescencja po ketozie				✓		✓
Po korekcji lewostronnego i prawostronnego przemieszczenia trawieńca				± ✓	✓	✓
Zmniejszenie ryzyka lewostronnego przemieszczenia trawieńca			✓			
Zmniejszenie ryzyka gorączki mlekowej/ hipokalcemii			✓			
Zatrucie spowodowane przez żółędzie, starca jakubka, szczwół wodny itp.		✓				± ✓